J Kynast

Berlijn 1976

Probleme der Frühdiagnose "Hypernephroides Nierencarcinom"

D I S S E R T A T I O N

zur Erlangung des akademischen Grades

doctor medicinae (Dr.med.)

vorgelegt der

Medizinischen Fakultät des Wissenschaftlichen Rates

der Humboldt-Universität zu Berlin

von

Dipl.med. Jürgen K y n a s t

geb. am: 13. 4. 1944 in: Eberswalde

Dekan: Prof. Dr. sc. med. G. Ließ

Gutachter: 1. _____

2. _____

3. _____

Berlin, den 1. März 1976

UNIV.
LEIDEN
BIBL.

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Einleitung	3
2.	Literaturübersicht	5
2.1.	Definition und Morphologie des hypernephroiden Carcinoms der Niere	5
2.2.	Diagnostik	9
2.3.	Differentialdiagnose des hypernephroiden Carcinoms der Niere	17
2.4.	Therapie	22
3.	Material und Methodik	30
4.	Ergebnisse	32
4.1.	Alters- und Geschlechtsverteilung	32
4.2.	Anamnestische Angaben	33
4.3.	Klinische Symptome	33
4.4.	Paraklinische Befunde	35
4.5.	Röntgenologische und radiologische Befunde	39
4.6.	Zusätzliche Auswertung detaillierter Untersuchungsergebnisse	40
4.7.	Statistische Auswertung	60

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548901_0028

		Seite
5.	Diskussion	64
5.1.	Alters- und Geschlechtsverteilung	64
5.2.	Anamnese	64
5.3.	Klinische Symptome, paraklinische Befunde	65
5.4.	Röntgenologisch-radiologische Befunde	75
5.5.	Tumorzeichen	78
5.6.	Sogenannte "Triasformen"	79
5.7.	Differentialdiagnostische Probleme	80
6.	Schlußfolgerungen	81
7.	Zusammenfassung	83
8.	Literaturverzeichnis	84
9.	Thesen	

1. Einleitung

Die Schwierigkeit der Früherkennung von Nierentumoren ist allgemein anerkannt (1, 4, 5, 11, 25, 45).

Uncharakteristische Beschwerden führen den Patienten mit oft erheblicher Verzögerung zum Arzt. Die Spätdiagnose, nicht selten als Zufallsbefund oder Zweitkrankheit gestellt, fällt bei 25 - 35 % der betroffenen Patienten ins Stadium der Metastasierung (10, 11, 45).

PAUL macht hierfür die symptomarme Frühphase, die vom Patienten bagatellisierte Haematurie, die vom Arzt verkannte Haematurie, die unvollständige Diagnostik und in Verbindung [illegible] eine urologische Zweitkrankheit verantwortlich (Zit. 45).

15 % aller Nierentumoren verbergen sich hinter Maskeraden (63, 65, 67). Prognosebestimmende Faktoren sind der biologische Charakter, die [illegible] des Tumors und der Zeitpunkt der Behandlung (68). Darüber hinaus werden [illegible] (33) der histologische Malignitätsgrad, die örtl. Gefäßwandbeteiligung, der Lymphknotenbefall und das Auftreten von Fern- und Frühmetastasen gesehen.

Die trotz diagnostischer und therapeutischer Fortschritte noch immer schlechte Prognose der Nierentumoren resultiert aus der außerordentlichen Malignität und [illegible] von Tumorprodromen bzw. das Auftreten einer nur geringen asymptomatischen Frühphase.

Die kurative Therapie bei malignen Nierentumoren besteht in der Kombination von Vorbestrahlung, Nephrektomie und Nachbestrahlung

und ist nur bei frühen (T_1 - T_3 der TNM-Klassifikation) Tumorstadien möglich (12, 25, 49). Später lassen sich lediglich palliative oder symptomatische Maßnahmen durchführen.

Nach K. BÜSHAMMER (13) entfallen 1 % aller Tumoren auf solche der Nieren, 90 % davon sind maligne. Mit einem Anteil von 82,5 % an allen malignen Nierentumoren nimmt hier das hypernephroide Karzinom eine Vorrangstellung ein.

Die vorliegende Arbeit versucht zu klären, inwieweit Symptomenkombinationen die Frühdiagnose entscheidend beeinflussen können bzw. ob diese eine frühzeitige, d.h. operable Form des Tumors zum Zeitpunkt der Diagnosestellung anzeigen.

2. Literaturübersicht

2.1. Definition und Terminologie des hypernephroiden Carcinoms der Niere

1965 erarbeitet die INTERNATIONAL UNION against CANCER die heute geltende Klassifikation der Nierengeschwülste (31).

Danach werden unterschieden:

A. Benigne Tumoren:

a) Tubuläres Adenom
b) Basophiles papilläres Adenom
c) Acidophiles papilläres Adenom
d) Klarzelladenom
(Adenom aus wasserklaren Zellen, benignes Hypernephrom, sog. hypernephroides Nierenadenom).

B. Maligne Tumoren:

a) Papilläres Adeno-Carcinom
b) Tubuläres Adeno-Carcinom
c) Hellzelliges Carcinom
(Malignes Hypernephrom, malignes hypernephroides Carcinom)
d) Embryonales Nephrom
(Wilms-Tumor).

Der Erkrankungsgipfel wird beim Mann zwischen dem 50. und 60., bei der Frau zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr, die Geschlechtsverteilung mit 2 : 1 angegeben (12, 13).

1884 zuerst von dem Greifswalder Pathologen P. GRAWITZ beschrieben, wird es von ihm wegen der mikroskopischen Ähnlichkeit mit den Zellen der Nebennierenrinde als "Struma suprarenalis aberrata" bezeichnet (24).

Er nimmt an, daß es sich hierbei um versprengte Nebennierenkeime handelt.

1899 beschreibt SUBLOX das Hypernephrom als Geschwulst des Nierenparenchyms (66).

1910 schlägt A.J. WOLKOW die Bezeichnung "hypernephroides Carcinom" vor (1).

1945 meint GRAWITZ anhand zahlreicher histologischer Untersuchungen nachweisen zu können, daß es sich um einen dysembryogenetischen Tumor des Nebennierenkeimes handelt (5). Nach der heutigen, auf elektronenmikroskopischen Untersuchungen beruhenden Auffassung stellen die hypernephroiden Nierencarcinome tubuläre Geschwülste der (5, 39, 92). Die uneinheitliche Bezeichnung des malignen [illegible] der Niere hat auf divergierende histogenetische Theorien zurückzuführen: «Gonio-Carcinom, clear cell [illegible]-carcinoma, epinephroider Tumor, Hypernephroma, [illegible]

makroskopischen Veränderungen anzeigt: Grawitz-Bezirke stellen das eigentliche Tumorparenchym dar, das einen überwiegend trabekulären Bau hat und aus den charakteristischen großen, fettgespeicherten "pflanzenzellähnlichen" Elementen besteht, die für diesen Tumor kennzeichnend sind.

Während die Zellen des Hypernephroms ein "wasserklares" Protoplasma beinhalten, haben die Nebennierenrindenepithelien einen schaumig-wabigen Protoplasmaaufbau. Im Bereich der makroskopisch gelben Areale sind dem Tumorparenchym lipoide eingelagert. Rote Bezirke kennzeichnen Frische, rotbraune ältere Einblutungen mit Hämosiderineinlagerungen. Nekrosen und Narbenbezirke vervollkommnen das "bunte Bild".

Kleine Hypernephrome können manchmal gutartig sein. Es handelt sich hierbei um sogenannte Nierenadenome (33, 38). Ein expansives Wachstum über Jahre hinaus und unter Ausbildung einer Tumorkapsel kann plötzlich in Destruktion der Kapsel und Metastasierung übergehen (19, 38).

Lundblad, dem die indifferente Bezeichnung "Grawitz-Tumor" zu weitab muß, gibt in seiner Tumorklassifikation einen klaren, histomorphologischen Überblick und kennzeichnet den fließenden Übergang vom benignen zum malignen Tumor (38).

a) Benigne Grawitz-Tumoren,
histologisch charakterisiert durch

- solid-alveolären Bau des Tumors
- tubuläre Formationen, kommen sie hie und da in Zysten mit intrazystischer Papillenbildung erwähnen
- niemals papillärer Bau

- Tumorzellen: "Pflanzenzellen", "Holundermarkzellen", "wasserklare Zellen"
- intakte Kapsel
- Fehlen einer peritumorösen Entzündung.

b) Fraglich benigne Grawitz-Tumoren, histologisch charakterisiert durch

- infiltrierte, durchbrochene oder auf weite Strecken zerstörte Kapsel
- Zellen zeigen Übergangsformen oder z.T. reine Formen von intermediären Zellen. Das Plasma ist nicht mehr wasserklar, sondern leicht granuliert (nach APITZ soll die Häufigkeit dieser Tumorformen bis zum 47. Lebensjahr zunehmen, danach aber wieder rückläufig sein (38).

c) Maligne Grawitz-Tumoren,

- entwickeln schon makroskopisch das bunte Bild des hypernephroiden Carcinoms und sind histologisch gekennzeichnet durch
  - nur die Reste der alten Kapsel sind erhalten
  - meistens Kombinationen von solid-[illegible] zystischem und zystopapillärem Wachstum
  - plasmareiche Zellen mit ausgesprochener Neigung zur Riesenzellbildung.

d) [illegible]

- [illegible] APITZ in 10 % der Nierentumoren [illegible]

- Der Übergang von malignen Grawitz-Tumoren in sarkomatös entartete ist mit einer Malignitätssteigerung verbunden.

Vom hypernephroiden Nierencarcinom abzugrenzen ist das seltene und im internationalen Schrifttum außerordentlich umstrittene echte Hypernephrom (Hypernephroma verum), das sich durch endokrine Aktivität auszeichnet und ein Cushing-Syndrom bzw. einen Morbus Cushing auslösen kann. ZOLLINGER berichtet über zwei Fälle im Weltschrifttum, ein dritter wird von H.J. MAURER et al. angeführt (45, 83).

2.2. Diagnostik

In der Diagnostik der Nierentumoren, insbesondere des hypernephroiden Carcinoms der Niere, stützt man sich auf charakteristische Symptome, denen von verschiedener Autoren jedoch unterschiedliche Bedeutung beigemessen wird. Werden an dieser Stelle die einzelnen Symptome in der Reihenfolge der Häufigkeit, wie sie in der Mehrzahl der Literatur angegeben sind, abgehandelt, so finden sie nochmals in der Diskussion in der Folge der Häufigkeit ihres Auftretens beim eigenen Krankengut ausführlich Erwähnung. Es sind dies die Hämaturie (3, 11, 41, 84), die [illegible] der BSG, das Serumfibrins (9, 11), die Anämie (59, 84) und Hypertonie (1, 11, [illegible] 57, 84).

Es folgen der palpable Tumor (11, 55), die Temperaturerhöhung (3, 7, 11, 29), der Gewichtsverlust (3, 55), Schmerzen (3, 27, 43, 55, 56, 60), unklare abdominelle Beschwerden (2), von [illegible] ausgehende Beschwerden (11, 52, 58) sowie Polyglobulie und Tumorkachexie (3, 9, 56).

Der H a e m a t u r i e wird ein hervorragender Platz in der Diagnostik von Nierentumoren eingeräumt. Sie gilt nach übereinstimmender Meinung vieler Autoren (3, 11, 12, 56, 57, 62) als führendes Symptom beim hypernephroiden Nierenadenom. [illegible] Auftreten einer Hämaturie sofort eine [illegible] Tumordiagnostik bzw. Tumor[illegible]diagnostik betrieben werden. ISRAEL (30) beschreibt sie bei Nierentumoren als [illegible] und "lawinös" auftretend, ohne äußeren Anlaß wechselnd, um einen oder mehrere Tage anzuhalten und dann zu stagnieren. Sie ist weitgehend unabhängig von traumatischen Einflüssen; selbst ein schweres Trauma braucht sie nicht auszulösen. Kolikartige Beschwerden können durch Gerinnselbildung im Ureter verursacht werden und differentialdiagnostische Schwierigkeiten gegenüber der Urolithiasis bieten.

„JUNGE", SCHOTT und TEMPLIN (3) finden Makrohaematurie bei 33 % ihrer Patienten mit Hypernephrom, SCHULZ et al. (62) bei 39 %, BERGMANN und LIPSKY (11) bei 30 %. Die Makrohaematurie, im fortgeschrittenen Tumorstadium auftretend, ist auf Einbruch des Tumors ins Nierenbecken und seine Kongestionierung zurückzuführen, während die [illegible] haematurie durch eine toxische Kapillar[illegible] intrakapsulären Tumorsitz hervorgerufen [illegible]

Die B S R - B e s c h l e u n i g u n g wird in sehr unterschiedlicher Häufigkeit angegeben. Schwankungen zwischen 1,3 und 83 % stehen sich gegenüber (3, 11, 42, 62). Sie wird beim hypernephroiden Nierencarcinom als oft frühzeitig und besonders stark erhöht angegeben und ist zurückzuführen auf Verschiebungen der Plasmaproteine zur grobdispersen Seite, auf die beim Hypernephrom so beobachtete Polyglobulie und die Fibrinerhöhung im Serum.

Der [illegible] gilt als [illegible] zeichen und ist prognostisch ungünstig einzuschätzen. CURTIS (56) beschreibt ihn als [illegible] in seitlichen Mittel-Unterbauch gelegen, von teils glatter und teils höckriger Oberfläche. [illegible] und LINDE (11) bezeichnen ihn häufig als Erstsymptom an. Es handelt sich bei palpablen Nierentumoren fast immer um solche bei tiefgelegener Niere oder am Pol des unteren Nierenpols. Das linksseitige Hypernephrom kann einen Milztumor vortäuschen (62).

Der H y p e r t o n u s wird bei der Diagnostik von Nierencarcinomen unterschiedliche Bedeutung zugesprochen. ISRAEL et al. (62) finden sie in 92 % ihres einschlägigen Krankengutes, [illegible] und LINDE (11) nur in 1 %.

ISRAEL (30) beobachtet bei 10 % seiner Hypernephrom-Kranken T e m p e r a t u r e r h ö h u n g . Er unterscheidet initiales Fieber, das als Erstsymptom auftreten kann, vom intermittierenden, regellos auftretenden und remittierenden Fieber im Endstadium der Cachexierung und Toxämie.

Das hypernephroide Carcinom der Niere scheint ihm bei der Differentialdiagnose unklarer Fieberzustände in nur unzureichendem Maße berücksichtigt. Fieber kann über lange Zeit hinweg das einzige Symptom darstellen (56), was im besonderen Maße für die palpatorisch und röntgenologisch nur schwer zugänglichen Tumoren des oberen Nierenpols zutrifft.

Die A n a e m i e wird beim hypernephroiden Nierencarcinom zwischen 25 (56) und 81 % (47) angegeben. Sie tritt in Form der Eisenmangelanaemie bei entsprechender Hämaturie, der "Tumoranaemie" bei Metastasierung des Tumors ins Knochenmark und der renalen Anaemie in Folge der extrakorpuskulär bedingten hämolytischen Anaemie auf.

F i b r i n e r h ö h u n g im Serum beschreibt F.H. SCHULZ (60) vor allem beim Bronchial-Carcinom und bei Tumoren mit Lebermetastasierung.

Bei Fernmetastasierung oder starker Tumornekrose dagegen ist wiederum ein Absinken des Fibrinspiegels im Serum zu registrieren. SEIDEL (4) untersuchte während der Operationsvorbereitung von 40 Magen-Carcinom erkrankten Patienten das Verhältnis des Plasma-Fibrinogenspiegels zum Geschwulstvolumen. Der Anstieg des Serum-Fibrins verläuft, seinen Untersuchungsergebnissen zufolge, parallel zum Tumorwachstum. SCHMIDT und SCHULZ (57) diskutieren als Ursache der erhöhten Fibrinwerte den allgemeinen Versuch der Abschirmung des Organismus gegen den Tumor und seine Reaktion auf den zu Zerfall und sekundärer Infektion neigenden Tumor.

Uneinheitliches Verhalten der Plasma-Fibrin-Konzentration im Serum bei Tumoren vergleichbarer Ausdehnung können derzeit nicht erklärt werden (9).

BECKER (9) spricht dem Verhalten des Plasmafibrins eine gute Aussagekraft hinsichtlich der Frage nach der Operabilität eines Tumors zu.

S c h m e r z e n können durch den Nierentumor selbst oder durch seine Metastasen verursacht werden. Durch den Tumor bedingter Schmerz wird beim hypernephroiden Nierencarcinom zwischen 40 und 70 % (3, 11, 28, 42, 44, 56, 57, 62) beschrieben. Er wird vom Patienten zumeist als Druckgefühl von bohrendem Charakter, als kypseher Kolikschmerz oder als Blasenschmerz beschrieben (11). Nicht selten führen erst die von den Metastasen eines hypernephroiden Nierenkarzinoms ausgehenden Beschwerden zu seiner Diagnose (7, 10, 35, 49, 57).

ANGERVALL und Mitarbeiter, MAIER und Mc.DONALD, BELL und ROBSON (4, 8, 10, 35) finden bei ihrem Krankengut zum Zeitpunkt der Operation Metastasen in 70 % in der Nierenkapsel, 28 % im perirenalen Gewebe, 32 - 40 % in den Lymphgefäßen des Nierenstiels und den regionalen, paraaortalen und parakavalen sowie iliacalen Lymphknoten, 10 - 24 % in den Nebennieren, 29 - 54 % in den Nierenvenen und in 9,5 % Tumorthrombenin der V.cava.

SCHLEIER und HEINZE (58) weisen ausdrücklich darauf hin, daß, abgesehen von der Metastasierung in die regionalen Lymphknoten und in das Lymphgefäßsystem, dem "venösen Verbindungssystem", vor allem bei Operationen, besondere Aufmerksamkeit

zu widmen ist. Es assistenzieren hier neben der Nierenvene und der großen Hohlvene die Nierenkapselvenen mit den vertebralen Venenplexus, den Nebennieren- und Lumbalvenen, den Spermatikus- bzw. Ovarien-Venen, der V. phrenica sowie der V. azygos.

SCHRAUM (60) gibt die Organmetastasierung in folgender Reihenfolge an: Lunge, Lymphknoten, Leber, mit Abstand danach folgen Gehirn, Schilddrüse, Haut und Auge. Lungenmetastasen eines hypernephroiden Nierenkarzinoms sind von einem primären Lungenkarzinom oft nur schwer zu unterscheiden.

Die T u m o r k a c h e x i e tritt häufig zusammen mit Temperaturerhöhungen auf. Sie ist nach DOLLHAUSEN (13) nicht unbedingt ein Spätzeichen oder Zeichen der Inoperabilität zu werten. SCHLEUN (36) findet bei 19 von insgesamt 25 Hypernephrom-Patienten Zeichen der Tumorkachexie.

Zwei kasuistische Beiträge zur s e k u n d ä r e n P o l y z y t h ä m i e geben LEHNERT und SCHNEIDER (39). Sie weisen den postoperativen Abfall der Polyzythämie zu Normwerten nach. Eingehend soll hierzu im Abschnitt Diskussion Stellung genommen werden.

OMLAND (48) beobachtet ein gleiches Verhalten der Polyzythämie im postoperativen Stadium und darüber hinaus ein erneutes Auftreten mit dem Nachweis von Metastasen.

Die V a r i k o z e l e tritt infolge Kompression der V. spermatica durch Tumormassen oder durch Blutung in die Vene durch einen in der

V. renalis liegenden Tumorzapfen auf. Kennzeichnend für die Tumorgenese ist die Unbeeinflußbarkeit der Stauung durch Anheben des Hodens. ANDRÉE, RAMFT und TEMPLIN (3) beobachten einen [illegible] (1A) [illegible] mit Varikozele die Tumorgenese verneint.

Von den in der Literatur beschriebenen röntgenologischen und radiologischen Verfahren gibt erst das iv-Urogramm einen Hinweis auf das Vorliegen eines Tumors, während zur Erstellung der endgültigen Diagnose immer angiografische Methoden heranzuziehen sind (62). Die Renovasografie stellt ein selektives Verfahren zur Nierendarstellung dar, wird in verschiedenen Modifikationen angewandt und läßt Aussagen über die Vaskularität des Tumors und das Verhalten zu seiner Kapsel, zur Frage der Infiltration des umgebenden Gewebes, des Einwachsens eines Tumorzapfens in das Nierenvenensystem, des Einbruches in den perirenalen Fettkörper und darüber hinaus und schließlich der Verdrängung von und des Einwachsens in Nachbarorgane, zu.

Man unterscheidet vier Phasen des Renovasogramms:

1. arterielle Phase
2. kapilläre Phase
3. venöse Phase
4. Ausscheidungsphase.

Dieser Methode wird die höchste Aussagekraft bei Nierentumoren zugesprochen (6, 45, 46, 62).

Mit Hilfe der Nieren-Phlebografie ist es möglich, durch Tumoreinbruch in das renale Venensystem hervorgerufene Einengungen nachzuweisen.

Neben diesen speziellen Methoden können einfache röntgenologische Verfahren, wie sie die Abdomen-Übersichts- bzw. Nieren-Leer-aufnahme verkörpert, nur als grob orientierende Methoden bestehen und dürfen auf keinen Fall allein zum röntgenologischen Tumornachweis herangezogen werden. Es ist hierbei die direkte oder indirekte Tumordarstellung infolge Massenzunahme, Organdeformierung, Überschreiten der Körper-Mittellinie durch Tumormassen, Verkalkungen im Tumorparenchym oder "Verlieren" der Psoasrandkontur möglich.

Aus der Häufigkeit des Auftretens klinischer Symptome und paraklinischer Veränderungen wird versucht, typische T r i a s f o r m e n zu entwickeln.

Es sind dies die sogenannte "klassische" Trias, mit Haematurie, palpablem Tumor und Schmerz, die YOUTE-Trias (77), mit Haematurie, Fieber und Erhöhung der BSR und die "extrarenale Trias", mit Fieber, Anaemie und Hyperhaptoglobinaemie (14).

Bei Vorliegen solcher Triasformen sollte stets an ein hypernephroides Nierencarcinom gedacht und die spezifische Diagnostik eingeleitet werden, da nach internationalen Erfahrungen (14, 49, 51, 56, 62) in diesen Fällen die Diagnose in einem hohen Prozentsatz gesichert werden kann.

2.). Differentialdiagnose des hypernephroiden Carcinoms der Niere

Ein zentraler Platz bei der Erörterung differentialdiagnostischer Aspekte des Hypernephroms gebührt dem Symptom Haematurie hinsichtlich seiner Genese.

Die Haematurie ist nach BOSHAMER (13) überwiegend tumorbedingt. Sie kann aber auch entzündlicher Genese sein oder ihre Ursache in einer Urolithiasis, einer prostatischen Harnblutung oder Antikoagulantienbehandlung haben. TÜMMERS und WEISSBACH (73) weisen in ihrer kasuistischen Arbeit auf solche differentialdiagnostische Schwierigkeiten hin, die vor allem bei Vorhandensein urologischer Zweiterkrankungen die gezielte Tumordiagnostik oft verzögern lassen. Eine solche Verzögerung ist zum Teil dem Patienten, zum Teil aber auch dem behandelnden Arzt zur Last zu legen (11, 13, 14, 62). Die Makrohaematurie bei [illegible] sein (20). Dem entgegen stehen Erfahrungen, daß auch ein schweres Trauma bei vorhandenem Tumor eine solche Harnblutung kaum auszulösen braucht (30). Neben den oben angeführten Erkrankungen sind zur Differentialdiagnose des hypernephroiden Nierencarcinoms sämtliche [illegible] heranzuziehen (Tab. 1). Von den bösartigen Nierengeschwülsten der Niere treten sonstige Carcinome seltener auf, als das hypernephroide Carcinom (dieses mit einem Anteil von [illegible] aller Nieren-Malignomen (13)). Es besteht keine

ausgesprochene Geschlechts- und Altersdisposition. Die Haematurie ist meist weniger intensiv (20).

S a r k o m e der Niere treten vorwiegend bei Kindern auf. Bei meist beidseitig angegebenem Tiefenmaß [illegible] ein pathologischer Harnbefund nachweisen.

Die b e n i g n e n Nierentumoren (Fibrom, Lipom, Angiom und Lymphangiom) werden klinisch und paraklinisch kaum auffällig.

I. Solide Nierentumoren

1. benigne Tumoren
(Fibrom, Lipom, Angiom, Lymphadenom)

2. maligne Tumoren
(Carcinom, Sarkom, Hypernephrom)

II. Nierenzysten

1. solitäre Zysten
2. pararenale Zysten
3. Zystennieren

III. Solide NN-Tumoren

1. NN-Mark-Tumoren
(Phäochromozytom)

2. NNR-Tumoren
Z. fasciculata
Z. reticularis
Z. glomerulosa

IV. NN-Zysten

V. Sympathicus-Tumoren

(Neuroblastom,
Sympathicogoniom,
Ganglioneurom)

VI. Milzzysten

VII. Milzsarkom

VIII. Pankreaszysten
Retentionszysten
Proliferationszysten
Pseudozysten

IX. Solide Pankreastumoren
Pankreasadenom
Pankreascarcinom

X. Echinococcuszysten

Tabelle 1: Differentialdiagnose der Retroperitonealtumoren

(modifiziert nach H. DUTZ und R. SINGER in: Diagnose und Differentialdiagnose innerer Krankheiten von H. DUTZ, H. KLEINSORGE, F.H. SCHULZ - VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1969)

N i e r e n z y s t e n kommen in Form von solitären Nierenzysten, generalisierter Zystose und Zystennieren vor. Sie bieten klinisch kaum eine Symptomatik. Zystennieren treten meist beidseitig auf, sind von höckriger Oberfläche und vermindern die Hypertonie und Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit der Nieren mit Rest-N-Erhöhung (20).

Koexistenz von Nierenzysten und hypernephroidem Nierencarcinom oder auch die Entstehung des Malignoms in der Zyste sind beschrieben (37, 46) und können differentialdiagnostische Schwierigkeiten bieten. Klärung muß dann die Punktion der Zyste und die zytologische Untersuchung des Punktates bringen (37). SCHMIDT (13) findet einen Anteil von 5 % des Vorliegens eines hypernephroiden Carcinoms in einer Zyste an insgesamt von ihm beobachteten Nierenzysten und fordert, daß jede solitäre Nierenzyste operativ entfernt werden sollte. Nach Infektion einer Zyste kann es, wie beim Hypernephrom, zu Hämaturie und mäßiger Albuminurie bei ungestörter Nierenfunktion kommen (20).

S o l i d e N e b e n n i e r e n t u m o r e n bedingen auf Grund ihrer spezifischen Hormonaktivität typische Krankheitsbilder. Sie lassen sich durch ihre charakteristische Klinik und Paraklinik leicht vom Hypernephrom abgrenzen:

Der Nebennierenmark-Tumor (Phäochromozytom) bewirkt Blutdruckkrisen und in 5) % Hämatochromie, Erhöhung der Katecholamine i.S.

Die Nebennierenrindentumoren werden nach ihrem Ursprung unterschieden in:

1. Tumoren der Zona fasciculata, die ein CUSHING-Syndrom auslösen und in der Parakrinik Hydroxycorticoid-Erhöhung i.S., Hypokaliaemie, Hyperglykaemie und Lymphopenie bewirken. Hier muß nochmals auf das in der Literatur sehr selten beschriebene echte Hypernephrom ("Hypernephroma verum") verwiesen werden, das sich durch endokrine Aktivität auszeichnet und ein CUSHING-Syndrom bzw. einen M. CUSHING auslösen kann (45).

2. Tumoren der Z. reticularis verursachen das "Adrenogenitale Syndrom mit Erhöhung der 17-Ketosteroide i.S.

3. Tumoren der Z. glomerulosa rufen das CONN-Syndrom hervor mit Erhöhung des Aldosteron im Serum, Renin-Senkung, Hypokali-, Hypernatriaemie und Alkalose.

S y m p a t h i c u s t u m o r e n (Neuroblastom, Sympathicogonium, Ganglioneurom) führen zu Diarrhoen, Hypertonie und Flush, zur Erhöhung von DOPA, Dopamin, VMS und Noradrenalin i.S. (beim Ganglioneurom nur VMS und Noradrenalin).

M i l z z y s t e n und das M i l z s a r k o m machen kaum Allgemeinerscheinungen und keine Veränderungen der Laborchemie. Zysten können evtl. gleichzeitig in anderen Organen nachgewiesen werden.

Das linksseitige Hypernephrom kann, zumeist bei tiefgelegener Niere oder Tumoren des unteren Nierenpols, einen Milztumor vortäuschen (56).

P a n k r e a s z y s t e n im Pankreasschwanzbereich - Retentions- oder Proliferationszysten - sind zumeist als Tumoren im Epigastrium palpabel und machen kaum Allgemeinerscheinungen oder praktische Auffälligkeiten. Pankreaspseudozysten entstehen durch Nekrosen in der Folge von Traumen, Entzündungen oder der Pankreasapoplexie und zeichnen sich durch einen äußerst raschen Verlauf und oft sehr großes Tumor-Volumen aus.

Demgegenüber machen s o l i d e P a n k r e a s t u m o r e n typische Krankheitsbilder. Das Pankreasadenom kann hypoglykaemische Zustände, bis hin zum hypoglykaemischen Schock, auslösen.

Das Pankreascarcinom zeigt sich als zumeist schmerzhafter Tumor im Epigastrium und führt zu Dyspepsie, Meteorismus, Aszites. Ein Diabetes mellitus kann ausgelöst werden.

E c h i n o k o k k u s z y s t e n , meist der Milz oder des Pankreas, haben eine uncharakteristische Klinik. Sie bewirken Eosinophilie des Blutbildes und einen positiven Aff-Huttest.

Therapie

Voraussetzung zur Schaffung einheitlicher Therapierichtlinien bildet eine einheitliche Klassifizierung der Pankreasgeschwülste hinsichtlich ihrer Ausdehnung. Diese erfolgt nach den Richtlinien der UICC (Union Internationale

Centre le Cancer, [illegible] (76). Sie ist begründet auf klinischen, röntgenologischen und endoskopischen Untersuchungsmethoden.

[illegible]

T_1 = keine Nierenvergrößerung, ureterales Gesamtkalkbild

T_2 = Niere vergrößert, Beweglichkeit nicht beeinträchtigt oder ureterales Stein Verschattung mehrerer Kelche oder Verbreiterung des Ureters

T_3 = Niere vergrößert, Beweglichkeit beeinträchtigt oder ureterales Nierenbecken oder Gefäßkompression (z.B. Varikozele)

T_4 = Niere vergrößert und völlig fixiert

Regionale LK N

N_x = wenn regionale Lymphknoten nicht nachgewiesen werden können (kann durch spätere histologische Befunde ergänzt werden, z.B. N_{x+})

N_0 = [illegible]

N_1 = [illegible]

[illegible]

M_0 = keine Fernmetastasen

M_1 = [illegible]

M_{1a} = [illegible]

Tabelle 1: [illegible] der Nierenprozesse (UICC 1968)

Nach seiner histologischen Differenzierung ist das hypernephroide Carcinom der Niere den malignen epithelialen Geschwülsten des Nierenparenchyms zuzuordnen (1, 2, 5).

ARNDT fügt der WHO-Klassifikation ein weiteres System zur Spezifizierung des Sicherheitsgrades [illegible]

S_1 = Aussage allein auf Tastbefund beruhend

S_2 = Aussage beruht auf beurteilbaren klinischen Untersuchungsmethoden (Röntgendiagnostik, Endoskopie etc.)

S_3 = Aussagen auf Grund des Op-Befundes

S_4 = Aussagen wie S_2 und mikroskopische Informationen nach Punktion oder Endoskopie

S_5 = Aussagen auf Grund eines Probeeingriffes mit histologischer Untersuchung

S_6 = S_3 und pathologisch-anatomische und histologische Beurteilung des Operationspräparates

S_7 = [illegible]

Tabelle 3: Spezifizierung des Sicherheitsgrades bei Nierenmalignomen (S-System) nach ARNDT (in: ARNDT, J.: Indikationen und Grenzen der Strahlentherapie bösartiger Neubildungen. - VEB Gustav Fischer, Jena [illegible]

Die optimale Therapieform stellt bei Nierentumoren der Stadien T_3 und T_4 nach Ansicht vieler Autoren (15, 36, 49, 58, 66, 75) die Kombination Vorbestrahlung - Nephrektomie - Nachbestrahlung dar.

Für die Tumorklasse T_1 und T_2 gibt der Therapieerfolg in der kombinierten Vorbehandlung - Operation und Operation - Nachbestrahlung gleich gut ist (6).

Die Aufgaben der Vorbehandlung von Uterusmalignomen besteht nach allem darin, daß

1. durch Verminderung der strahlenempfindlichen Zellen der Tumor verkleinert werden soll, um die Operation zu erleichtern.
2. die während der Operation auftretenden Keime vernichtet werden.
3. die den Tumor umgebende Entzündung eingedämmt und somit ein günstigerer operationstechnischer Verlauf gewährleistet wird.
4. auch bei Fällen von biologischer und technischer Inoperabilität gute Heilungserfolge, manchmal sogar Wiederherstellung der Operabilität, erzielt worden sind (6).

Daraus läßt sich nochmals der vorrangige Wert der Teilbestrahlung für Tumoren der Stadien T_3 und T_4 ableiten. Bei T_1 und T_2 besteht auf Grund der besseren Übersichtlichkeit der Operationsumgebung gegenüber sicher abgegrenzte Tumoren.

Bei Metastasen ist die Teilbestrahlung günstig, falls diese bekannt liegen. Ist jedoch ohne Erfolg bei Drüsenmetastasen [illegible] zeigt gute Erfolge bei Kindern (WILMS-Tumoren).

Die [illegible] ist nicht besonders strahlenempfindliches Organ (6). Trotz [illegible] sind [illegible] Veränderungen, [illegible]

erfolge mit Gehirnkobalt (Einzeldosis 200 rd bis Gesamtdosis 6000 rd) und ultraharter Röntgenstrahlung (Einzeldosis 200 rd, Gesamtdosis 6000 rd).

Bei dem therapierendus Vorbestrahlung - Operation - Nachbestrahlung wird die Gesamtdosis von 6000 rd in zweimal 3000 rd aufgeteilt.

SCHMIDT und HEINZ (94) stellen in einer wegweisenden Arbeit über die operative und strahlentherapeutische Behandlung von Nierentumoren zwei Haupttendenzungen an die T U M O R N E P H R E K T O M I E :

1. Radikalität

   - der transperitoneale oder thoracoabdominale Zugang wird dem Flankenschnitt wegen der besseren Übersichtlichkeit des Operationsfeldes vorgezogen

   - En-bloc-Resektion der Tumor-Niere einschließlich renalem Fett, Nebennieren und regionalen sowie ildiakalen Lymphknoten.

2. Verhinderung von Tumorzellaussaat während des Eingriffs durch

   - primäre Unterbindung der Nierenarterie, danach Unterbindung der Nierenvene oder

   - simultane Abklemmung der Nierenstielgefäße.

Auch FRANZ (51) weist auf die große Gefahr der haematogenen Tumorausschwemmung in Richtung des pyelorenalen Reflexes und die zahlreichen venösen Verbindungen hin. Er lehnt aus diesen Gründen auch die retrograde Pyelographie und das Kompres-

Das renale "Verbundsystem" der Nieren findet im Diskussionsteil dieser Arbeit ausführlichere Berücksichtigung.

Z Y T O S T A T I K A kommen beim derzeitigen Therapiestand im Tumorstadium T_4 mit multipler Metastasierung oder bei biologischer Inoperabilität zur Anwendung (5, 6). Die Pharma ca Mitomen, Colsil und E 39 sind zugunsten von Zyklophosphamid und Endoxan verlassen (3). Sie werden, auch in Kombination mit der Strahlentherapie angewandt, der

Eine spezifische Chemotherapie der Nierengeschwülste oder sogar des hypernephroiden Nierencarcinoms gibt es nicht. Erfolge können nur bedingt erzielt werden. Die insgesamt noch unbefriedigenden Ergebnisse sind auf die ungenügende Tumor-Spezifität auf der einen und die mangelnde

auf der anderen Seite zurückzuführen (58, 69).

Ein darüber hinaus existierender und bisher wis-

lässt unterschiedliche und nur bedingt vergleichbare Behandlungsergebnisse bei verschiedenen Patienten

und Modus der Metastasierung erkennen.

1. Monotherapie

1. VINBLASTIN	5 mg 10 mg	10 Tage jeden 14. Tag P a u s e 6-12 Wochen	200 mg	Gute Remission bei Tumorgenesetastasen
	10 mg	jeden 14. Tag	200 mg (etc.)	
2. Cyclophosphamid	25 mg/kg Kö-Gewicht	jeden 10. Tag	Dauertherapie	Blutbild
3. Trinimen oder	0,2 mg 0,4 mg/2. Tag	20 Tage 20 Tage	4 mg 4 mg	

Tabelle 4: Therapieschema für die Anwendung von Zytostatika bei hypernephroidem Carcinom der Niere [1]

[1] Für die Erarbeitung des hier angeführten Therapieschemas und wertvolle Unterstützung bei der Frage nach der Zytostatikatherapie des hypernephroiden Nierencarcinoms habe ich Frau Dr. med. J. Berndt, Geschwulstklinik (Direktor: Prof. Dr. sc. med. Rießbeck) des Bereichs Medizin (Charité) der Humboldt-Universität Berlin, herzlich zu danken.

3. Material und Methodik

Es wird ein Krankengut von 54 Patienten mit histologisch gesichertem hypernephroiden Carcinom der Niere ausgewertet.

Bedingt durch einen Untersuchungszeitraum von über 20 Jahren ist das Spektrum, vor allem der laborchemischen und röntgenologisch-radiologischen Angaben, unterschiedlich. Deshalb gelangt eine Gruppe mit einer Vielzahl detaillierter und vergleichbarer anamnestischer klinischer und paraklinischer Angaben zusätzlich zur Auswertung.

Besondere Beachtung erfahren neben der Alters- und Geschlechtsverteilung, der Anamnese und dem Aufnahmestatus paraklinische Befunde: Hb, Hk, Differential-Leukozytenzählung, BKS, CRP, SGOT, SGPT, alk. Phosphatase, Bilirubin i.S., Fibrin i.S., Haptoglobin, Serumeisen, Harnstoff-N., Kreatinin i.S., Urinstatus und -kultur, Cholesterol i.S., Gerinnungsstatus, Immun-Elektrophorese, Rose-Coombs-Test, Kältagglutination und Serumbelastogramm.

Die Bestimmung der blutchemischen Werte erfolgte im Zentrallabor des Bereiches Medizin der Humboldt-Universität Berlin nach standardisierten Methoden entsprechend den Empfehlungen des DAB 7. Hitzefibrinbestimmung nach SCHULZ (61).

Röntgenologisch-radiologische Verfahren wie Abdomen-Übersichts- bzw. Nierenleeraufnahme, iv-Urografie, Retropneumoperitoneum und Renovasografie werden nach ihren Aussagekriterien und der Verfügbarkeit hinsichtlich der Diagnosefindung und des röntgenologischen und [illegible]

suchT.

Schließlich werden allgemeine Symptomgruppen von solchen, die auf einen Nierentumor hinweisen, unterschieden und verschiedene "Triaden" beim hypernephroiden Nierentumor einander gegenübergestellt.

4. Ergebnisse

4.1. Bei der Gegenüberstellung von Geschlechts- und Altersverteilung zeigte sich Folgendes [illegible]:

Alter (Jahre)	Anzahl Patienten	(%)	davon weiblich	davon männlich
unter 40	6	11	21	33
40 - 60	24	44		
über 60	24	44		
entspricht Geschlechtsverteilung:			1 :	1,5

Tabelle 5: Alters- und Geschlechtsverteilung von 54 Patienten mit hypernephroidem Carcinom der Niere

Patienten der Altersgruppen 40. - 60. Lebensjahr und älter überwiegen in unserem Krankengut.

Die Analyse der Geschlechtsverteilung ergibt, daß der Mann im Verhältnis von 1,5 : 1 häufiger am Hypernephrom erkrankt, als die Frau.

4.2. Die Auswertung anamnestischer Angaben ergab:

	Schmerz	Gew. verl.	palp. Tm	Appet. verl.	Fieber	Hämaturie Makro-	Hämat.
Pat.	40	46	25	25	16	24	19
(%)	74	89	46	46	30	39	35

Tabelle 6: Angaben zur Anamnese

Gewichtsverlust wird häufiger registriert als Hematurie und Schmerz. Erst danach folgen der palpable Tumor und Fieber.

4.3. Folgende pathologische Befunde im Status praesens sind zu beschreiben:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Leberschwellung		
[illegible]	5	9	- delent	1	
[illegible]	5	9	- indol.	21	3
[illegible]	1		[illegible]		
[illegible]	1		- delent	-	
[illegible]	22	43	- indol.	4	
[illegible]	3	6	Klopfschm. Ni.		
[illegible]	2	4	- rechts	10	19
[illegible]	6	11	- links	8	14

[illegible] Pathologische Veränderungen im Status praesens

[illegible] des rechten und linken Nierenlagers in 18,5 bzw. 19 % der Fälle und bei [illegible] auf Leberschwellung bzw. [illegible] zurückzuführen.

palp.Resistenz	Oberbauch rechts Pat.	%	links Pat.	%	Mittelbauch rechts Pat.	%	links Pat.	%
dolent	4	7	2	4	1	(2)	–	–
indolent	–	–	–	–	–	–	–	–

palp.Resistens	Unterbauch rechts Pat.	%	links Pat.	%	Nierenlager rechts Pat.	%	links Pat.	%
dolent	–	–	–	–	–	–	–	–
indolent	–	–	–	–	4	7	8	15

Tabelle 8: Lokalbefund

Eine palpable Resistens wird bei 4 Patienten im rechten und bei 8 Patienten im linken Nierenlager registriert und ist in allen Fällen dolent.

	bis 120/90 Pat.	%	bis 140/105 Pat.	%	höher 160/105 Pat.	%
	11	18				

	bis [illegible] Pat.	%	höher [illegible] Pat.	%
Ikter	4	7	1	(2)

Tabelle 9: Pathologisches Verhalten von Blutdruck und Körpertemperatur

Der Blutdruck erreicht schon bei 40 % der [illegible] normal, ist bei 15 Patienten mit [illegible] 160/105 mm Hg mäßig und bei 13 [illegible] (Werte von über 160/110 mm Hg).

4.4. Die Untersuchung pathologischer Befunde bezüglich

BSR-Beschleunigung	höher 20/40 Pat.	%	der höher 100/100ex Pat.	%
	56	67	14	26

Harnkultur (Bacterium.)	E. coli Pat.	%	Enterococc. Pat.	%	Sarcine Pat.	%
	34	63	8	15	9	17

Makrohaematur. Pat.	%	Mikrohaematur. Pat.	%	Albuminurie Pat.	%	Leucocyturie Pat.	%
15	28	34	63	8	15	18	33

Tabelle 10: Pathologische Veränderungen von BSR, Harnkultur und -sediment

Die BSR-Beschleunigung zeigt bei 67 % der Patienten Werte von mehr als 20/40 mm. "Pseudosenkungen" mit Werten von über 100/100ex werden in 26 % angetroffen.

Die Untersuchung der Harnkultur zeigt E. coli, der bei 63 % angetroffen wird, als weitaus häufigsten Keim vor Sarcine (17%) und Enterococcus (15 %).

Likrohaematurie (63 %) und Leucocyturie (33 %) werden häufiger beobachtet als Makrohaematurie (28 %) und Albuminurie (15 %).

						gesamt	♂
Hämoglobin		<	12	g%		33	32
Hämatokrit	♂	<	54	%			
	♀	<	37	%			
Leukozytose		>	10	000		16	34
Leukopenie		<	5	000		16	34
[illegible]							
Differenzierung	Eosin		2,5			8	14
	[illegible]						
	[illegible]						
	Stabk.		2-3			14	26
	Segm.		32			14	26
	Lymphoz.		35			13	24
	Monoz.		4			14	26
						Anzahl Fall-Lauf	
vorw. Leber-Fkt.-Prüfung	alk.-P-ase	>	47	KE	32	18	82
	[illegible]	>	1,1	mg%		-	-
	Fibrin i.S.	>	500	mg%	34	31	91
	Haptoglobin				32	2	11
	[illegible]	<	80	Gamma	22	18	82
vorw. Nieren-Fkt.-Prüfung	Harnst.-N.					2	9
	Kreatinin i.S.	>	2	mg%	26	4	15

Tabelle 11: Pathologische blutchemische Veränderungen

Die Analyse blutchemischer Befunde zeigt die Erhöhung des Serum-Fibrins bei 37 von insgesamt 34 Bestimmungen (91 %) als führenden pathologischen Indikator. Es folgen die Erhöhung der alk. Phosphatase und Senkung des Serum-Fe in je 82 % des untersuchten Krankengutes und die Senkung des [illegible]

Fraktionen	Anzahl Path.-Befd.	Anzahl der pathol. Befunde
$alpha_1$	22	11
$alpha_2$		15
beta		7
gamma		11
$alpha_1$ & $alpha_2$		8
$alpha_1$ & beta		1
$alpha_1$ & gamma		1
$alpha_2$ & beta		-
$alpha_2$ & gamma		-
beta & gamma		-
$alpha_1$ & $alpha_2$ & beta		1
$alpha_1$ & $alpha_2$ & gamma		2
$alpha_2$ & beta & gamma		-
$alpha_1$ & $alpha_2$ & beta & gamma		3
Albumine		2
Haptoglobine		2

Tabelle 12: Pathologische Veränderungen von Einzelfraktionen in der Elektrophorese und deren Kombinationen

Im Spektrum pathologischer Veränderungen in der Elektrophorese überwiegt die isolierte $alpha_2$-Erhöhung bei 15 Patienten (68 %), gefolgt von der isolierten Erhöhung von alpha, und gamma bei jeweils 11 Patienten (50 %). Pathologischer Ausfall von Fraktionskombinationen ist selten.


Patienten
16
14
12
10
8
6
4
2
Fraktionen

[illegible]

	Verdacht auf Abszeß nur Rö.	%	Verdachtung der endgültig. Diagnose bei	%
Abdomen-Übersichts-Aufnahme	3	6	-	-
Ir-Urographie	43	82	25	46
Renovasographie (von 29 Untersuchungen)			29	100

Tabelle 15: Röntgendiagnostik

Die Rolle der Abdomen-Übersichts-Aufnahme kann in drei Fällen den Verdacht auf das Vorliegen eines Nierenabszess ausgesprochen werden. Schon die Verfahren der Ir-Urographie und retrograden Pyelographie ergeben in 43 Fällen (82 %) den Hinweis-Charakter.

Die Angiographie (Renovasographie) führt in allen Fällen zur endgültigen Diagnose.

4.6. Von den insgesamt 34 untersuchten Patienten gelangen 19 Patienten gesondert zur Auswertung, da bei diesen eine umfangreiche Diagnostik mittels moderner Untersuchungsverfahren vollständig vorliegt, so daß eine umfangreiche vergleichende Betrachtung der Einzelparameter möglich wird.

Alters- und Geschlechtsverteilung

Alter (Jahre)	Anzahl Patienten	%	davon männlich	%	davon weiblich	%
unter 40	1	-	1	(5,3)	-	-
40 - 60	9	47,4	4	21,1	5	26,3
über 60	9	47,4	6	31,6	3	15,8
entspricht der Geschlechtsverteilung			1,4	:	1	

Tabelle 14: Alters- und Geschlechtsverteilung der Patienten mit hyperamphroidem Adenom

Die Altersgruppen 40 - 60 und über 60 Lebensjahre sind bei unserem Krankengut mit 18 von insgesamt 19 Fällen repräsentiert. Patienten im 5. und 6. Lebensdezennium sind ebenso häufig vertreten, wie Patienten im Alter von über 60 Jahren.

Die Geschlechtsverteilung verhält sich männlich : weiblich wie 1,4 : 1.

Anamnese	Monate 6 Pat.	%	6-12 Pat.	%	6 Pat.	%	Anamnese	Monate 6 Pat.	%
Schmerz	5	26	4	21	2	11	Übelkeit	4	21
Gewichtsv.	9	47	-	-	-	-	Dysurie	6	32
Palp. Tu.									
dolent	8	42	-	-	-	-	Pollakiur.	3	16
indolent	3	16	-	-	-	-	Hematur.		
Appetit	3	16	-	-	-	-	Makro-	12	63
Obstipat.	2	11	-	-	-	-	Mikro-	3	16
Diarrhoe	2	11	-	-	-	-	Diagnose all.		
Fieber	3	16	-	-	-	-	ein d. para-kl. Verfahr.	3	16

Tabelle 15: Die wichtigsten Angaben zur

Unter den anamnestischen Angaben treten die Makrohaematurie in 63 % des Krankengutes, Dysurie in 32 %, Gewichtsverlust in 47 %, der palpable Tumor, dolent in 42 % und indolent in 16 % hervor. Die Anamnesendauer beträgt bei Ausnahme des Schmerzes weniger als sechs Monate. Schmerzen werden in 26 % mit weniger als 6 Monate bestehend, in 21 % als 6 - 12 Monaten und in 11 % als über 12 Monate bestehend angegeben.

Auffällig ist, daß 16 % der Patienten allein auf Grund paraklinischer Veränderungen, die anläßlich Reihenuntersuchungen oder Routine-Lungenuntersuchungen in Lehrpraxen routinemäßig gestellt wurden, zur klinischen Diagnostik gelangten.

[illegible]

	Pat.	%		Pat.	%
redun. HZ	2	11	Leberschw.		
redun. AZ	2	11	- dolent	-	-
Ikterus	3	16	- indolent	11	58
Palm.eryth.	1	(5)	Milzschw.		
Ödemneigung	1	(5)	- dolent	-	
prämt. Ged.	8	42	- indolent	3	16
Exophthalm.	2	11	Klopfschm.NL.		
Struma	1	(5)	- rechts	3	16
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabelle 16: Pathologische Veränderungen im Status praesens

Im Status praesens treten Klopfschmerz des rechten und linken Nierenlagers sowie die indolente Milzschwellung (Differentialdiagnose Milzschwellung - Tumor der linken Niere !) in 16 % auf. Tumorkachexie wird in 11 % beobachtet.

Die übrigen Befunde sind, im Zusammenhang [illegible] und mit Ausnahme von Struma, Exophthalmus, Ikterus und Palmarerythem, als kardiale Dekompensationszeichen zu werten.

palpable Resistenz	Oberbauch rechts Pat.	%	links Pat.	%	Mittelbauch rechts Pat.	%	links Pat.	%
dolent	1	–	1	–	–	–	–	–
indolent								

palpable Resistenz	Unterbauch rechts Pat.	%	links Pat.	%	Nierenlager rechts Pat.	%	links Pat.	%
dolent	–	–	–	–	–	–	–	–
indolent	–	–	–	–	1	–	3	16

Tabelle 17: Lokalbefund

Eine palpable Resistenz ist bei 13 Patienten nachzuweisen; diese ist in 11 Fällen dolent und nur in 2 Fällen indolent. Die Lokalisation im Oberbauch ist mit 7 Patienten eindeutig häufiger als im Mittelbauch, wo sie nur bei 2 Erkrankten anzutreffen ist. Tumorlokalisation im Unterbauch wird nicht beobachtet (Beckenniere).

Eine Geschwulst im rechten Nierenlager wird einmal, im linken Nierenlager zweimal verzeichnet.

Nierenseitige Tumoren werden bei 9 Patienten

	bis 120/90		bis 160/105		über 160/105	
Blutdruck	Pat.	%	Pat.	%	Pat.	%
	7	37	7	37	5	26

	bis 38°C		über 38°C		Exitus letalis	
Fieber	Pat.	%	Pat.	%	Pat.	%
	3	16	4	21	4	21

Tabelle 18: Pathologisches Verhalten von Blutdruck und Körpertemperatur

Der Blutdruck verhält sich bei den untersuchten Patienten mit je 37 % normal (bis 120/90 mm Hg) bis leicht erhöht (bis 160/105 mm Hg). Druckwerte von über 160/105 mm Hg werden nur bei 27 % des Krankengutes beobachtet.

Paraklinische Befunde

	über 20/40		über 100/100br	
	Pat.	%	Pat.	%
	14	74	4	21

	E. coli		Enterococcen		Sonstige	
	Pat.	%	Pat.	%	Pat.	%
	13	68	2	11	4	21

	Mikrohaematurie		Makrohaematurie		Normalbefund	
	Pat.	%	Pat.	%	Pat.	%
	11	58	2	11	6	32

Tabelle 19: Pathologischer Urinbefund

Die BSG-Beschleunigung zeigt bei 73 % der Patienten Werte von über 20/40 mm. "Immunsenkung" mit Werten von 100/100ex wird nur in 26 % beobachtet.

Bei den untersuchten Harnkulturen tritt E. coli in 68 % auf, und damit häufiger als Saruine (21 %) und Enterococcus (11 %).

Mikrohaematurie (58 %) und Leucocyturie (42 %) werden häufiger beobachtet als Makrohaematurie (32 %) und Albuminurie (11 %).

Haemoglobin		<	12,0 g%		12	
Haematokrit		♀ <	45	%	1	
Leukozytose		>	10 000		4	
Leukopenie		<	5 000			
Diff.-Leuko-zytenzählung	Eosinoph.		0-1			
	Basoph.		2,5			
	Myelo.					
	Meta.		0-1			
	Stabk.		2-3			
	Segm.		52			
	Lymph.		41			
	Monoz.		4			
vers. Leber-Fkt.-Prüfung	SGOT	>	17	U		
	SGPT	>	22	U		
	alk. P-ase	>	47	U		
	Bili i.S.	>	1,1	mg%		
	Fibrin i.S.	>	500	mg%		
	Haptoglobin					
	Serum-Fe.	<	80	γ%	17	
		>	2			
		<	11			
vers. Diarrhoe-Untersuch.	Gerinnsel	>	2			
	Eiweiss	>	1			

Anlage 20: Pathologische Blutchemiewerte [illegible]

Bei der Auswertung blutchemischer Befunde werden besonders auffällig die Häufigkeiten der pathologisch geminderten Hämoglobinwerte (65 %), des erhöhten Serumeisens (74 %), des gesenkten Serum-Eisens (89 %) und der in 66 % erhöhten Alkal. Phosphatase. Fe- und Serum-Eisen-Verlust dürften somit Ausdruck des Blutverlustes sein.

Der in sieben Fällen untersuchte G e r i n n u n g s s t a t u s , bestehend aus dem Quick-Wert, der Bestimmung der Faktoren II, V, VII, X, des Heparin-Antithrombin-, Serum-Antithrombin, Desprothrombin im Serum zeigt in vier Fällen einen auf einen Tumor oder entzündlichen Prozeß hinweisenden Befund, drei Untersuchungen bleiben ohne pathologischen Befund.

Immun-Elektrophorese, Rose-Coombs-Test, Kälteagglutination und Thrombelastogramm erlauben keine pathognomonische Aussage.

Röntgenologische und radiologische Befunde

Abdomen-Übersichts- bzw. Nierenleeraufnahme							
Massenzunahme d. Niere		Kalkschatten		vorw. Parenchymbereich			
Pat.	%	Pat.	%	Pat.	%		
4	-	-	-	2	11		

Tabelle 21: Von den 19 untersuchten Patienten fanden in einem Fall die Massenzunahme der Niere und in zwei Fällen "verwischte" Parenchymkonturen zum Nierentumor-Verdacht. Damit läßt sich ableiten, daß diese röntgenologische Methode nicht allein zum Nachweis eines Nierentumors angewandt werden kann.

	Kelch-deform. Pat.	%	Kelch-einbr. Pat.	%	Negativ-darstellg. Pat.	%	Darstellg.d. Ureters Pat.	%
1. Zyst. Urografie	13	68	6	32	3	16	1	
2. Schicht-untersuchung	1	-	-	-	-	-	-	-
3. Pneumo-peritoneum	4	21	-	-	-	-	3	16
4. Infusions-urografie	1	-	-	-	-	-	-	-
5. Schicht-untersuchung	1	-	-	-	-	-	1	-
6. retrograde Pyelografie	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 22: Aus den hier angeführten röntgenologischen Methoden, auch in Kombination mit ausschließlichen Verfahren wie Schichtuntersuchungen und Retropneumoperitoneum, geht ebenfalls nur in 21 % der Fälle die Verdachtsdiagnose Nierentumor hervor.

	abdom. Aorto-grafie		Reno-vaso-grafie		Nieren-phlebo-grafie		Coeli-aco-grafie		Cavo-grafie		Lympho-grafie	
Pathol. Gefäße	1	(100)	8	42	-		-		1	(100)	2	(100)
Parench.-infiltrat.	-	-	7	37	-		-		1	(100)	-	-
Durchbruch Nieren-L.	-	-	4	21	-		-		-	-	-	-
Einbruch perirenales Fett	-	-	4	21	-		-		-	-	-	-
Nachw. Nachbarorgane	-	-	3	16	-		-		-	-	-	-
Verdrängung Nachbarorg.	-	-	4	21	-		-		-	-	-	-
Nachw. Tm-Zapfen									1	(100)		
Treffsicherheit der Tm-Diagnose (1)	1	(100)	9	(100)	-		-		1	(100)	2	(100)

Tabelle 23: [illegible] Diagnose des hypernephroiden Carcinoms unterstreicht die Notwendigkeit der angiografischen Untersuchungsmethoden bei der Diagnostik von Nierentumoren bzw. der Lymphografie zum Nachweis von Metastasen.

(1) [illegible] Lymphografie und Cavografie wurden [illegible] Lymphografie in zwei Fällen [illegible]

Tabellen 21 - 23: Untersuchung der Aussagen klinisch-genealogischer Verfahren hinsichtlich der maßgeblichen Kriterien und Aufschlüsselung ihres Anteils an der Erstellung der endgültigen Diagnose.

Der Verdacht auf einen Mammatumor mußte in einem Fall anläßlich des Magen-Röntgens und in einem anderen während der Colon-Kontrastmittelaufnahme gestellt werden.

	Zahl	%
knöcherner Thorax	1	-
Schädel	-	-
Schultergelenke	-	-
Brustwirbelsäule	1	-
Halswirbelsäule	1	-
knöchernes Becken	2	11
Oberschenkel	1	-

Tabelle 24: Röntgenologischer Metastasennachweis beim hypernephroiden Nierenkarzinom.

Ergebnisse der röntgenologischen Untersuchung des Skelets sind in zwei Fällen in Frage kommend bei der Alvan Feldkamp Methode gewesen, in der Brustwirbelsäule, der Halswirbelsäule und im Femur nachgewiesen.

Ultraschall-Hepatogramm	
Gallen-Szintigramm	
[illegible]	

Tabelle 21: Metastasennachweis beim hypernephroiden Nierenkarzinom mit Hilfe von Radiogrammen.
(Es wurden die hier angegebenen Methoden nur da je einem Falle angewandt).

Nachgewiesen können mit Hilfe des einmal angefertigten Ultraschall-Hepatogramms bei einem Patienten Lebermetastasen nachgewiesen werden. Die Gallen-[illegible] und die Befunde, die in 4 einem Falle zur Anwendung kamen, blieben ohne [illegible].

Vergleich der wichtigsten Ergebnisse aus Anamnese, Klinik und Paraklinik mit Angaben aus der Literatur

	Literatur	% d. Kliguten	% d. eigenen Kliguten
BSR-Beschl.	3,11,41,61	1,33,9,65	55
Serum - Fe			89
Haematurie			89
- Makro-H.	11	33,39,70	32
- Mikro-H.	3,11,61	98	68
Fibrin	9	22	74
Anaemie	55,61	29,81	63
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
palp. Tumor	11,55	25,75	56
Fieber	3,7,11,29	7 - 40	47
Gewichtsverlust	3,55	40 - 89	47
Schmerz	3,27,43,56	31 - 41	32
Übelkeit	11	49	21
Metastasen	11,52,98	25 - 39	21
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dysglobulie	56	6	11
[illegible]	56	6	11

Tabelle 26: Die wichtigsten anamnestischen, klinischen und paraklinischen pathologischen Veränderungen im Vergleich zu Angaben in der Literatur

Im Vergleich der Häufigkeiten von klinischen und paraklinischen Veränderungen bei unserem Krankengut mit denen aus der einschlägigen Literatur [illegible]

Auffallend hoch finden wir den prozentualen Anteil der Patienten mit BSG-Beschleunigung und die Fibrinerhöhung im Serum. Unter den in der Literatur beschriebenen Häufigkeiten liegen bei unseren Patienten der Anteil der Hämorrhagematurie und das Vorliegen von Metastasen.

A. Allgemeine Tumorzeichen			
anamnestisch, klinisch	%	paraklinisch	%
Müdigkeit	58	B S R	95
Gewichtsverlust	47	Fibrin	74
praetib. Ödeme	47	Serum - Fe	39
Fieber	47	H b	65
Übelkeit/Erbrechen	21	↑Cholesterol i.S.	11
Appetitverlust	16	↓Cholesterol i.S.	-
Tumor-Kachexie	11		
Hypertonie	-		
Diarrhoe	-		

Tabelle 27: Einordnung der beim hypernephroiden Nierencarcinom auftretenden Symptome in Gruppen - Allgemeine Tumorzeichen

Während allgemeine Tumorzeichen, soweit sie der Anamnese und dem klinischen Erscheinungsbild zugeordnet werden müssen (Müdigkeit, Gewichtsverlust, Fieber, unklare abdominelle Beschwerden und Tumor-Kachexie), in nur 11 - 58 % angetroffen werden, sind die paraklinischen, auf einen Tumor hinweisenden Befunde wie die Beschleunigung der BSR, Erhöhung des Serum-Fibrins, Senkung des Serum-Eisens und Anaemie in 63 - 95 % anzutreffen und führen mit größerer Sicherheit und in einem höheren Prozentsatz zum Tumorverdacht und zur Einleitung einer speziellen Tumordiagnostik.

B. Auf einen Nierentumor hinweisende [illegible]	
anamnestisch, klinisch	%
Hypertonie	63
palp. Tumor	58
Dysurie	37
Schmerz im Nierenlager	32
Pollakiurie	21
Lidoedeme	-
Varikocele	-

paraklinisch	%
Makrohaematurie	32
Mikrohaematurie	58
Bakteriurie E.coli	68
Sarcina	21
Enterococo	11
Leucozyturie	11
Polyglobulie	11
↑Kreatinin i.S.	-
[illegible]matokrit	[illegible]
Hypokaliaemie	-
[illegible]	[illegible]

[illegible] Häufigkeit der beim hypernephroiden Nierencarcinom auftretenden Symptome
[illegible] Gruppen - Auf einen Nierentumor hinweisende Symptome

Mit Hilfe der auf einen Nierentumor hinweisenden paraklinischen Befunde (Haematurie, Bakteriurie, Leukozyturie und Polyglobulie) sollte, unter Berücksichtigung aller bisher erhobenen klinischen, anamnestischen und paraklinischen Befunde, die Erstellung der vorläufigen Diagnose "Nierentumor" möglich sein, auch wenn kaum alle Symptome gleichzeitig vorliegen dürften.

Differentialdiagnostische Probleme

Einen Einblick in die Problematik der Diagnose und Differentialdiagnose des Hypernephroms Nierencarcinoms gibt der Vergleich der Einweisungsdiagnosen bei 19 Patienten mit histologisch gesichertem Hypernephrom.

Einweisungsdiagnose	Pat.
Oberbauch-Tumor unklarer Genese	3
Verdacht auf Nierentumor	3
Pyelonephritis	3
Hypertonie	3
Unklarer Oberbauchschmerz	3
Plasmozytom	1
Morbus Hodgkin	1
Hepatosplenomegalie	1
Anämie unklarer Genese	1
Hypernephroides Nierencarcinom	-

Tabelle 8a: Einweisungsdiagnosen bei 19 Patienten mit Hypernephrom

Häufigste Symptomkombinationen

Sogenannte "Klassische Trias"

Haematurie	84 %	16mal
palpabler Tumor	63 %	12mal
Schmerz	58 %	11mal

V C U T E - Trias

Haematurie	84 %	16mal
Fieber	47 %	9mal
Erhöhung der BSR	95 %	18mal

" e x t r a r e n a l e " Trias

Fieber	47 %	9mal
Anaemie	63 %	12mal
[illegible]	[illegible]	[illegible]

S y m p t o m k o m b i n a t i o n ,
die beim eigenen Krankengut am häufigsten
anzutreffen war.

Erhöhung der BSR	95 %	18mal
Haematurie	84 %	16mal
Fibrin-Erhöhung i.S.	74 %	14mal

Vergleich der Häufigkeiten von Symptomen der bekannten Triasformen beim hypernephroiden Corcinom der Niere mit der häufigsten Symptomkombination beim eigenen Krankengut


häufigste
Symtomkombination
beim eigenen
Krankengut
VOUTE-
Trias
20
16
12
8
4
16 12 8 4
4 8 12 16
4
8
12
sogenannte
„klassische
Trias"
„extrarenale" Trias
(BAUMANN und
Mitarbeiter)


Patienten
16
14
12
10
8
6
4
2
A
B
C
D
"Triasform"

4.7. Statistische Auswertung

Bei einem statistischen Vergleich der gegebenen prozentualen Häufigkeiten des positiven Ausfalls der Triasformen lassen sich mit Hilfe des x^2 - Testes folgende Werte errechnen:

1.

5	9	14
14	10	24
19	19	38

$x^2 = 1,93$

Der statistische Vergleich der sogenannten "klassischen" Trias mit der Veute-Trias ergibt keinen statistischen Unterschied.

2.

[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	19	38

$x^2 = 1,78$

Auch der statistische Vergleich der "klassischen" mit der extrarenalen Trias zeigt keinen statistisch signifikanten Unterschied.

3.

5	16	21
14	3	17
19	19	38

$x^2 = 10,74$

Beim Vergleich der "klassischen" Trias mit der beim eigenen Krankengut am häufigsten angetroffenen Symptomkombination (Trias) zeigt sich ein statistisch hoch signifikanter Unterschied mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1 %.

6.	9	1	10
	10	10	20
	19	11	30

χ^2 = 1.99

Auch der Vergleich der Kombination aus der extrazonalen Trias zeigt einen statistisch hoch signifikanten Unterschied. Irrtumswahrscheinlichkeit = 1 %.

7.	1	16	17
	18	2	20
	19	18	37

χ^2 = 26,16

Der statistische Vergleich zwischen der extrazonalen Trias und der im eigenen Formengut am häufigsten vertretenen Symptomkombination ist hoch signifikant. Die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt bei 1 %.

	1	2	3	4
1	–	∅	∅	++
2	–	–	++	+
3	–	–	–	++
4	–	–	–	–

Die Gabelle 34 bezeich, der also die bei beschriebenen Kennzeichen in häufigster ausgeprägter Symptomkonstellation (Leber, Appetit, Ikterus von allen anderen unterscheiden. Daraus läßt sich ableiten, daß Casse Fulac - Basenkrise, Hyperchlorämiegruppe, DOS-Krankheit - am ehesten zur Verbesserung des hypochromatischen Syndroms geeignet ist.

5. [illegible]

5.1. Alters- und Geschlechtsverteilung

An unserem Patientengut kann eine mit den Literaturangaben übereinstimmende Altersspanne (5. – 6. Dezennium) und Geschlechtsverteilung (Männer : Frauen = 1,4 : 1) registriert werden (12,13).

5.2. [illegible]

Einen Überblick zu den Angaben der Patienten hinsichtlich der Beschwerden beim hypernephroiden Carcinom der Niere geben die Tabellen 6 und 15. Hiernach nimmt die Hämaturie die führende Stellung ein. Diese führte alle Patienten innerhalb eines Zeitraumen von 6 Monaten nach ihren Auftreten zum Arzt. Es folgen ihr der Häufigkeit ihres Auftretens entsprechend der Gewichtsverlust von mehr als 5 kg innerhalb eines halben Jahres, der dolente und palpable Tumor, Fieberhaftigkeit, Übelkeit und Erbrechen.

Fieber wird, verglichen mit den klinisch erhobenen Werten in der Anamnese, niedrig angegeben.

Während Obstipation und Diarrhoe selten angegeben werden, ist auffällig, daß ein großer Teil der Patienten allein auf Grund pathologischer paraklinischer Veränderungen, die anläßlich von Routineuntersuchungen zu Ruheaufenthalten, Betriebsuntersuchungen etc.

wenn alle bisher aufgeführten Symptome die Patienten innerhalb des Zeitraumes eines halben Jahres nach ihrem ersten Auftreten zum Arzt führen, ist es auffällig, daß gerade der Schmerz als Beschwerden begründend wird. Die Arztkonsultation erfolgt nur zu einem Viertel innerhalb der 6-Monatsfrist. Ein weiteres Viertel der Patienten zögern den Arztbesuch über 6-12 Monate, andere noch länger hinaus. Bei den weiblichen Patienten fehlen Angaben hierzu (Tabelle 6).

Die führenden Symptome (vergleiche auch Tabelle 29) sollen jetzt in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit diskutiert werden:

9.2. Klinische Symptome, wahrscheinliche Befunde

B e s c h l e u n i g u n g d e r S a l i :

Für ihr Entstehen ist die Verschiebung der Plasmaproteine zur gerinnungsaktiven Seite wesentlich. Die auftretende Polyglobulie und die Fibrinvermehrung (s. auch dort) mögen auch beim hyperemphysiden Syndrom der Niere mitmöglich an der Salzretention beteiligt sein. Hier ist sie oft frühzeitig bemerkenswert und auffallend hoch. Den eigenen Ergebnissen von 95 % stehen Häufigkeitsschwankungen von 1 bis 83 % gegenüber (3, 11, 40, 62).

D i e H a e m a t u r i e ist nach übereinstimmender Meinung vieler Autoren (3, 11, 12, 56, 57, 62) als führendes Symptom bei

[illegible] Nierenbeckentumoren [illegible]. Da sie überwiegend tumorbedingt ist, muß bei jeder Hämaturie auf die sofortige Klärung der Ursache gedrungen werden (13). Der Verlauf bei Nierenbeckentumoren wird von [illegible] als regellos und scheinbar launisch beschrieben (30): Jetzt eine Zeitlang, einen oder mehrere Tage andauernd, um dann wieder zu stocken. Selbst die schwarze Urinfarbe braucht eine solche Farbblutung nicht auszulösen. Differentialdiagnostische Schwierigkeiten können die durch Gerinnselbildung im Ureter hervorgerufenen typischen kolikartigen Schmerzen gegenüber der Urolithiasis bieten.

Die Mikrohaematurie wird bei noch intrarenalgelegenem Tumorsitz durch eine auftretende toxische Nephritis verursacht, während die Makrohaematurie auf die Kongestionierung im Tumor, der jetzt ins Nierenbecken eintritt, zurückgeführt werden muß (12).

[illegible]rohaematurie wird von ANDREW, HAUET und TEMPLIN (3) in 33 % der untersuchten Patienten, von J. SCHULZ, BLUMENBERG und [illegible] (62) in 39 %, von BERGMANN und LEPSKY (14) bis zu 90 % [illegible] über stehen 32 % Mikrohaematurie und 98 % Makrohaematurie, die beim eigenen Patientengut beobachtet worden.

[illegible]LZ (61) beschreibt [illegible] im Serum vor allem beim Bronchialkarzinom und bei Tumoren mit Lebermetastasierung. Die Bestimmung des Fibrinogenspiegels trifft erst bei Tumorgeneralisierung oder stärker tumorbedingte auf. [illegible] untersucht das Verhalten des Plasmafibrinogens und Tumorvolumen während der Operation beim Magen-Karzinom. Er findet

einen Anstieg des Hämatokrits, Anstieg von Leukozyten, bei 22 % bei 27 Untersuchungen zeigen also normale Blutwerte, in 25 % stark erhöhte Werte, wie sie bisher nur bei Hormonbehandlungen beschrieben sind (6). Auch Blutgerinnungstest und entsprechende Untersuchungen zeigen sich in 11 Fällen ohne Befund, in 3 Fällen eine mäßige Störung, in 3 Fällen Normalwerte, auch bei Patienten mit Lebermetastasierung und Knochen ist unterschiedliches Verhalten der Blutwerte festzustellen.

Als Ursache der sehr stark unterschiedlichen Werte diskutieren wir mit Schütz (37) mehrere Faktoren:

- den allgemeinen Versuch der Abwehrung des gesamten Organismus gegen den Tumor,
- die Reaktion des Organismus auf den nun Gewebe und nur sekundären Gefäßbau aufgebauten Tumor (auch bei gutartigen und allergischen Reaktionen kommt der Blutgerinnung zu Blutungserscheinungen).

Eine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten von Tumoren vorgeschlagenen Behandlung kann derzeit nicht gegeben werden. Brühl (9) glaubt, daß die Blutgerinnung der Ausgangspunkt nicht geeignet ist, da es auch bei großen Blutungsgewohnheiten zu tödlichen Embolien kommt, die von der Leber nicht mehr abgefangen werden und somit eine Verschleppung in Blutgefäßgebiet im Sinne einer Lebensgefährdung bewirken können. Er spricht diesen Fällen eine unterschiedliche Reaktionsfähigkeit des Körpers auf der Grundlage der Gewebsart des Tumors zu.

Die Blutdruckerkrankung bei Nierenneoplasien läßt sich gut in das o.a. Schema einordnen. SCHÄFER (56) kann bei 17 Nierencarcinompatienten nur einmal eine Hypertonie finden. LINDNER (mit. 56) bis zu 40 %, J. SCHMID et al. (62) finden bei 32 %, [illegible] (11) bei 4 % Hypertonie.

Eigenes Ergebnis: 63 %

Der P a l p a b l e T u m o r , in eigenem Krankengut zu 38 % festgestellt, weist eine schlechte Prognose aus und gilt als Spätzeichen (12, 56).

SCHÄFER (56) findet ihn bei 75 % seiner hypernephroiden Nierencarcinome anläßlich der stationären Aufnahme. Bei 4 von insgesamt 17 Patienten sei dieser schon sichtbar gewesen. Er beschreibt ihn als meist in seitlichen Mittel-Unterbauch palpabel und von teils glatter und teils höckriger Oberfläche. HERMANN und LIPSKY (11) finden ihn als Erstsymptom in 25 %. Es handelt sich hierbei fast [illegible] Niere oder solche des unteren Nierenpols (11, 12). Das linksseitige Hypernephroid kann einen Milztumor vortäuschen (62).

F i e b e r wird beim hypernephroiden Nierencarcinom in der Literatur als zwischen 7 und 40 % auftretend angegeben (3, 7, 11, 34). ZÖHRER (36) beobachtet bei 146 Hypernephrom-Patienten in 10 % Temperaturerhöhungen. Er unterscheidet

- initialen Fieber, das als Frühsymptom [illegible]

- [illegible] Fieber, das ergeben und-
  [illegible]

- Messen Fieber im Zusammenhang mit Unter-
  [illegible]

Das Hyperthyreose erscheint dem Autor als eine Mischkrankheitsbild, welches [illegible] in einer neuroendokrinen Lage begründet ist.

Nach Volhard (47) hat unter Millionen Einwohnern [illegible] der Leber, das Magens und Kolons sowie an den Lymphosarkom zu leiden.

Kaufmann (26) findet unter 475 Patienten mit Magen-Carcinomen in 47 % Temperaturerhöhung vom verschiedensten Typ, die wahrscheinlich allein auf den Tumor zurückzuführen sind.

Unter 60 Hypernephrom-Patienten findet Wiesel (47) 7 Patienten mit Fieber, davon in 5 Fällen solches vom remittierenden Typ. Demgegenüber stehen die eigenen Befunde:

Temperatur bis 38°C : 46 %,
höher als 38°C : 21 %,
sept.Temperaturverlauf : 11 %.

Fieber kann monatelang das einzige Initialsymptom darstellen (47). Das gilt besonders für Tumoren des oberen Mediastinums, die palpatorisch und röntgenologisch schwer zugänglich sind. Die therapeutische Deutung des Fieberzustandes beim hypernephroiden Carcinom der Niere ist bis heute nicht befriedigend. Als Ursachen gelten:

- [illegible] produkte, die als Pyrogene Fieber verursachen [illegible]

- [illegible] Substanzen den Organismus [illegible] (7, 9, 11, 30).

A l l g e m e i n e S y m p t o m e :

[illegible] wird von [illegible] und [illegible] (3) in 40 %, von [illegible] in 12 % (56), in eigenem Krankengut in 37 % angegeben.

Ingwersen: 45 % (3), eigenes Krankengut 78 %

Unklare abdominelle Beschwerden wie [illegible], [illegible], [illegible], Übelkeit und Blähungen werden in 40 % bei (41), in dieser Arbeit in 41 % angegeben.

S c h m e r z , in 40 - 74 % der Patienten mit hyperemesisartigem Erbrechen im Initialstadium beschrieben (3, 11, 20, 42, 44, 54, 57, 62), wird meist als Druckgefühl von bohrendem Charakter angegeben. Er tritt aber auch in Form typischer Koliken, als Krampfschmerz, Leibschmerz-Attacken oder Flankenschmerz auf (11) und wird vermutlich durch Spannung der Kapselkapsel bei schnellem Flüssigkeitsein- oder Einbluten in den Tumor. Schmerzen neuralgiformen Charakters mit Ausstrahlung in die Leistengegend zeigen den Durchbruch des Tumors durch die Kapselkapsel und die Invasion in die Umgebung an, die selten als Spätsymptom (3).

[illegible] kommen durch Hämatomisierung entstehende [illegible] des Tumorbetts.

Schmerz wird von ZIMMER in 51 % als Krankheitssymptom beobachtet (26), im eigenen Krankengut in 51 %.

[illegible] und [illegible] [illegible] [illegible]

35, 43, 57). Nach Untersuchungen von [illegible] und Mitarbeitern, [illegible] und [illegible], [illegible], ROBSON (4, 8, 10, 58) ermöglicht auch die lokale Metastasierung, so daß zum Zeitpunkt des operativen Eingriffs bei den von ihnen beobachteten Karzinomen in 7 % die Lymphknoten, in 20 % das parietale Peritoneum befallen sind. In den Lymphknoten der Abflußgebiete und in den regionalen, paraaortalen und parakavalen Lymphknoten konnten Metastasen in 22 - 40 %, in den Nebennieren in 10 - 24 % Metastasen, in der Milz/Pankreas in 20 - 24 % und in der Vena cava in 3,5 % Tumorthromben nachgewiesen (35). Abgesehen von der möglichen Metastasierung in die regionalen Lymphknoten und in das lymphatische System sind nach SCHMIDT und [illegible] (58) den "realen Verbreitungswegen", von denen bei operativen Eingriffen, besonders aufzupassen ist, die anastomosierenden Venen der Bauchwand und der großen Gefäße die Hämatogenmetastasen mit dem parietalen Peritoneum, den Nebennieren- und Lungenherden, den Spermatica- bzw. Ovarialvenen, der V. phrenica sowie der V. cava (Cave Tumorthrombenbildung) zu nennen (58).

SCHMIDT (60) beschreibt folgende Häufigkeit des Befallenseins von Organen: Lunge : 60 %, Lymphknoten : 40 %, Leber und Knochen : je 5 %. Mit Abstand folgen: Gehirn, Schilddrüse, Haut und andere Organe. Lungenmetastasen sind meistens multipel und können oft schwer von einem Lungenkarzinom der Lunge primär differenziert werden (32).

Seltene Fälle von Metastasierungen, die erst nach 12 - 15 Jahren nach der Erstoperation auftreten, sind bekannt (12). Auch hier beschreiben Kemeny und Mitarbeiter in 21 % nachweisbare

T u m o r t a c h y k a r d i e tritt nach ROSENBERGER (42) häufig in Verbindung mit Temperaturerhöhung auf und ist nicht unbedingt als Spätzeichen oder Zeichen der Inoperabilität zu werten. SCHÄFER (56) findet unter 25 Hypernephromfällen insgesamt 19 mit Tachykardiezeichen, diese Arbeit in 11 %.

In kasuistischen Beiträgen zu Patienten mit s e k u n d ä r e r P o l y z y t h ä m i e berichten LEHNERT und SCHWEINERT (38) über 2 Fälle von Hypernephrom und Nieren-Sarkom. Sie können den postoperativen Abfall der Polyzythaemie auf Normwerte nachweisen. In den Nieren wird ein spezifisches erythropoetisches System gebildet, das JACOBSON als "Erythropoetin" bezeichnet (32). Chemisch soll es sich dabei um ein Gluco- oder Mucopolysaccharid handeln, das papierelektrophoretisch mit der $Alpha_1$ und $Alpha_2$ - Globulinfraktion wandert (14). Erythropoetin kommt in Plasma und Urin nur in kleinen Mengen vor. Bei Anaemien wird ein Absinken, bei Polyzythaemien ein Ansteigen seiner Konzentration vermindert. Unklar ist, weshalb es im Einzelfall zur "Hypererythropoetinaemie" kommt, während sie in anderen Fall ausbleibt (16). OHLAND (40) beobachtet den Abfall der praeoperativ verzeichneten Polyzythaemie zu Normwerten im postoperativen Verlauf und ein Wiederansteigen mit dem Nachweis von Metastasen. Dieses Verhalten spricht für die Bildung des Erythropoetins in der Geschwulst bzw. in ihren Metastasen (40, 51).

H y p o k a l i ä m i e tritt nur in 2 % des untersuchten Krankengutes auf. Sie wird verursacht durch Erkrankungen des Nierenparenchyms im Bereich des distalen Tubulusabschnittes (renale Ursache). Das durch das Glomerulumfilter in den proximalen Tubulusabschnitt gelangende K^+ wird hier in vollem Umfang reabsorbiert. Im distalen Tubulus wird K^+ im Austausch gegen Na^+ sezerniert. Bei Störungen des Säure-Basen-Haushaltes im Sinne einer Azidose kann im Bereich des distalen Tubulus Na^+ gegen K^+ ausgetauscht und dieses zusammen mit Cl^- ausgeschieden werden.

Die erhöhte Aldosteronausscheidung der Nebennierenrinde beim sekundären Hyperaldosteronismus infolge renalen Ödems führt durch [illegible] durch erhöhte Na^+ - Retention zur vermehrten K^+ - Ausscheidung im Harn und damit zur Hypokaliämie. (Beim Cushing-Syndrom ist die erhöhte Glucocorticoid-Ausscheidung für die vermehrte K^+ - Ausscheidung verantwortlich zu machen (23)).

Die sehr selten vorkommende in der Folge eines Nieren-Malignoms auftretende V e n e n t h r o m b o s e ist in dieser causa sehr umstritten. Während ANDREEN et al. (3) einen solchen Fall beobachten, lehnt SCHÄPPI (54) bei einem Patienten den ursächlichen Zusammenhang zwischen aufgetretener Tumorembolie und Nierenkarzinom ab. In eigenen Untersuchungen konnte kein solcher Fall nachgewiesen werden. SCHNEIDER (52) bezeichnet sie als sehr selten auftretende [illegible] infolge Invasion der V. [illegible] einer Blutung in die Vene durch einen in das [illegible] wachsenden Tumorzapfen. Kennzeichnend für die Verursachung durch einen Tumor ist die Unterbrechbarkeit des Stauungszustandes durch Anlegen [illegible]

5.4. Röntgenologisch-radiologische Befunde

Die angewandten röntgenologisch-radiologischen Verfahren gestatten folgende Aussagen. Mit Hilfe der

der einfachen Form der Urinuntersuchung lassen sich nur Tumoren in fortgeschrittenen und meist inoperablen Stadium nachweisen. Aber können die Funktionsstörung der Niere, z.B. durch Nierenversagen, Insuffizienz (Polyurie, Anurie, Niereninsuffizienz) oder Überschwemmung des Blutkreislaufes durch Toxine, Verschlackungen im Harnvergiftung (Urämie) und Fehlen der Ausscheidungsorgane (Verschleimen) dargestellt sein. Die Nierenbeckenfüllung gibt darüber hinaus Aufschluß über evtl. Lageveränderungen der Niere und wird jeder Kontrastmittelausscheidung vorangestellt. Das Ausscheidungsurogramm, nach i.v.-Injektion eines wasserlöslichen Kontrastmittels angefertigt, ermöglicht Aussagen über die Leistungsfähigkeit des Harnbildenden Systems und Rückschlüsse auf die Nierenfunktion. Die Veränderungen des Nierenbeckensystems durch einen Tumor reichen von der diskreten Kelchdeformierung und Kelchverlängerung über den Tumoreinbruch ins Kelchsystem bis schließlich zur Negativdarstellung des NBKS.

Eine Kontrastmittelverdichtung und somit intensivere Abbildung läßt sich durch Kompression der Ureteren (Kompressionsurogramm) oder aber Erhöhung der Kontrastmittelmenge erreichen. Sie wird wegen der Gefahr der Tumorzellverschwemmung von vielen anderen abgelehnt (3, 31, 98).

5.1. Zusammenfassung

Es läßt sich beim Vergleichen der Häufigkeiten von klinischen und paraklinischen Veränderungen bei unserem Krankengut mit den aus der einschlägigen Literatur veröffentlichten Übereinstimmung feststellen. Ausnahmen hiervon finden wir bei den pleomorphen Anteil der Leukozyten mit BSR-Beschleunigung und Hämatokritsenkung im Serum. Unter den in der Literatur beschriebenen Häufigkeiten liegt bei unseren Patienten der Anteil der Hämoblastosen und das Vorliegen von Hepatosen. Schließlich lassen sich zu den Hemmen der Differenzierung von klinischen und paraklinischen Tumorzeichen allgemeine Tumorzeichen abgrenzen von solchen, die auf einen Hirntumor hinweisen.

Während allgemeine Tumorzeichen, soweit sie der Anamnese und den klinischen Untersuchungsmethoden entnommen sind (Müdigkeit, Leistungsunlust, Fieber, unklare abdominelle Beschwerden und Tumorkachexie), nur selten angetroffen werden, sind die paraklinischen, auf einen Hirntumor hinweisenden Befunde wie die BSR-Beschleunigung, Hyperchloämie, Hypokaliämie und Azidose häufig anzutreffen und führen mit großer Sicherheit zu einem Hirntumor und zur Einleitung einer speziellen Tumordiagnostik.

Mit Hilfe der auf ein neurologisches Geschehen hinweisenden paraklinischen Befunde wie Hemianopsie, Hemiplegie, Hemiparese und Polyglobulie sollte unter Berücksichtigung

Es kann daraus geschlossen werden, daß diese Tests - Leberbiopsie, Hyperthermieprovokation, ESR-Beschleunigung - zu gleichen Teilen zur Feststellung des hyperaciden Carcinoms der Niere geeignet ist.

5.7. Differentialdiagnostische Probleme

Bei der Analyse der Hinweisungsdiagnosen wird in den wenigsten Fällen der Verdacht auf einen Nierentumor registriert und damit anschließende Übereinstimmung mit der später gefundenen und in jedem Fall histologisch gesicherten Diagnose "hyperacides Carcinom" festgestellt. Diese Tatsache hebt die Schwierigkeit der Diagnosestellung im Sinne der Frühdiagnose und der Einstellung der Indikation zur Operation im erfolgversprechenden Tumorstadium nochmals hervor. Es wird bei den Hinweisungsdiagnosen "Hepatosplenomegalie", die sich sämtlich als linksseitige Nierentumoren herausstellen, ersichtlich, daß ein solcher linksseitiger Nierentumor eine Milzschwellung vortäuschen kann.

7. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den Symptomen und Symptomkombinationen bei Patienten mit gonidiogenen hyperemphysematischen Adenomonocinosen.

Bei der Untersuchung von Patienten, welche mit chronischen, intermittierenden und wiederholten Anfällen und von Vergleich mit den bisher bekannten symptomatischen Krankheitsformen führt sie eine neue Symptomatik - Differentialdiagnose, Prognose, Behandlung der Sammelkrankheiten -, die häufiger als die bisher bekannten Formen anzutreffen ist.

So kann diese Arbeit als Hinweis für das Vorliegen einer hyperembryoiden Adenomonocinose gewertet werden. Des weiteren wird das diagnostische Vorgehen, das sich als "Diagnostikprogramm" bewährt hat, diskutiert. Neben einer Wertung der einzelnen Parameter werden insbesondere die Kombinationen von Untersuchungsergebnissen aufgezeigt und kritisch diskutiert.

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

11. [illegible]

12. [illegible]

7. …
…
Stuttgart 1960

14. Dameshek, W.M. / …
Ann. Intern. Med. 68 (1962), …

15. Buchheim, J. …
Strahlentherapie 113 (1962), …

16. Gleiboe, A. / Gleiboe, K. …
Klin. Wschr. 37 (1959), 342

17. Hinn, W. …
Diss., Leipzig 1959

… / …
Urban, Bd. 2, 898

19. Hendricks, J. …
Klin. wsch. Wschr. 103 (1955), 650

… / Klages, L. …
Diagnose innerer Krankheiten von: E. Lube, K. Steinmetz, F.H. Schulz
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1969

… / …

Klin. wsch. Wschr. (1962), 1798

25. Seeber, …
Thieme Verlag Leipzig, Jena 1962

Klin. Wschr. 32 (1954), 624

Von Symptom zur Diagnose G. Thieme Verlag, Stuttgart, New York 1960

…

27. Holinger, Hur. / Hallhet, Neth.

Amer. urol. 21 (1961), 142

28. Hensch, H.

Urologe 1 (1962), 89

29. Hultquist, G.H.

Surgical Gynec. 103 (1947),

30. Kunkel, P.

Münch. med. Wschr. 37 (1957), 1911

31.

Klinotaxhod Human Hormaklabs.., puse Der the Internat. Union against Cancer. Berlin - Heidelberg - New York, Springer 1965

32. Fried, W. / Fleck, L.F.

Schilder, R.

Z. ärztl. Fortbild. 46 (1951), 664

33. Rettler, L.-H.

Lehrbuch der spez. Path. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1966

34.

35. Howell, T.H. / Hirschbaum, J.D.

J. Urol. 44 (1940), 455

36. Rutty, H. / Kramer, L.

Strahlentherapie 124 (1964), 161

37. Lang, K.K.

Radiology 101/1 (1971), 7

38. Langlechner, F.

Urol. Int. (Basel) 6 (1958), 273

39. Lehnert, Th. / [illegible] H.

Z. Urol. 57 (1964), 81

40. [illegible]

[illegible]
Nethr. mschr. Med. 23 (1961), 251

41. Ismail, A. Z. Urol. 54 (1961), 245

42. Mton, K. / [illegible] Jap. Urol. 8 (1961), 339

43. Lubarsch, O. In Henke-Lubarsch's Hb. spez. path. Anat. V/1, Springer, Berlin 1925

44. [illegible]

47. Maurer, Ed. / Jensen, E. / Maurer, E. Zentralbl. auf d. Geb. d. Ur.-Krankheiten 118, 5 (1975), 273

48. Merten, E. / Gerard, J. / [illegible] S. Zentbl. Konb. 1 (1974), 7

49. Patenel, L.G. / Stanoi, V. / Kelur, J. Strahlentherapie 124 (1964), 161

50. Pfeiffer, J. Radiobiol., Radiother. 11 (1970), 357

51. Pytel, A.J. Kongressbericht III. panelenes Urologenkongress (1965), Budapest 1967

52. [illegible] / [illegible] Z. Urol. 58 (1965), 421

53. [illegible] M.M. Beitr. z. Urol. 23 (1991), 297

54. [illegible] 12

55. Robson, C.J. — J. Urol. 93 (1965), 37

56. Schäfer, H. — Z. Urol. Nephr. 46 (1952), 651

57. Schmidt, G. / Schulz, F.H. — Dtsch. Ges. wes. 19 (1964), 2277

58. Schmiedt, E. / Thurn, [illegible] — Münch. Med. Wschr. 113 (1971) [illegible]

59. Schmitz, W. — Urologe 6 (1967), 139

60. Schramm, H. / Freund, E. — Brunns Beitr. klin Chir. 217 (1969), 421

61. Schulz, F.H. — Das Nierenkarzinom, Leipzig 1953/1959

62. Schulz, J. / Blumenberg, H. / Helius, C. / [illegible] / [illegible] / [illegible] — Münch. Ges. Wes. 28 (1973), 1647

63. Sigel, A. — Urologe 4 (1965), 87

64. Staehler, W. — Klinik und Praxis der Urologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1959

65. Staudinger / Winands — Zschr. exper. Med. 60 (1928), 136

66. Stendel, H.St. / Berndt, G. — Röntgenblätter 21 (1968), 69

67. Sturm, W. — Med. Wschr. H. 4, 255

68. [illegible] — Virchows Arch. 405 (1895), 405

69. [illegible] — Der Radiologe 12 (1972), 377

70. [illegible] — Arch. klin. Med. 208 (1962), 112

71. Trapeznikova, M.F. et al. Urol. i. nefrol. 33 (1968), 28

72. Tredt, H.J. Dtsch. Ges. Wes. 19 (1964), 716

73. Timmers, H. / Weißbach, J. Münch. Med. Wschr. 113 (1971), 485

74. Uebelhör, R. Wien. Kli. Wschr. 79 (1967), 261

75. [illegible]

76. Union Internationale Contre le Cancer: [illegible] of Malignant Tumors Imprimerie, H. de Buren, S.A., Genève 1960

77. Veute, C. Helv. med. acta 28 (1964), 25[illegible]

78. Walther, H.E. Krebsmetastasen Schwabe Verlag, Basel 1948

79. Wasmund, K.G. / Schneider, K.C. Z. Urol. Forth. 64 (1970), 2[illegible]

80. Weber, H.F.J. Z. Urol. 55 (1962), 631

81. Wildbolz, H. Lehrbuch der Urologie [illegible], Berlin [illegible]

82. Willis, R.A. Pathology of Tumors Butterworths, London 1948

83 [illegible] In: Doerr, W., E. Uehlinger: Spez. path. Anat., Bd. 3, Springer, Berlin - Heidelberg - New York 1966

Für das mir überlassene Thema dieser Arbeit und die Unterstützung bei seiner Durchführung sowie für viele wertvolle Hinweise zu sachlichen und didaktischen Fragen bedanke ich mich herzlich bei Herrn Professor Dr. sc. med. F.U. Schulz.

Meinem Chefarzt, Herrn MR. Dr. med. habil. V. Wolf, danke ich für seine wertvollen abschließenden Hinweise zu Fragen der Opera-

Jürgen K y n a s t

Probleme der Frühdiagnose
[illegible]

T h e s e n

- Das hypernephroide Carcinom der Niere stellt ein Krankheitsgeschehen dar, dessen Früherkennung hinsichtlich der operativen Therapie und postoperativen Heilungstendenz besonders dringlich erscheint.

- Es werden retrospektiv 54 Patienten mit einem histologisch gesicherten hypernephroiden Nierencarcinom ausgewertet, wobei insbesondere auf die Häufigkeit von Symptomkombinationen, die eine frühzeitige Erkennung des Krankheitsbildes erlauben, geachtet wird.

- Aus der Vielzahl von Einzelergebnissen, die sich aus anamnestischen, klinischen, paraklinischen und röntgenologischen Untersuchungen zusammensetzen, werden neben der Einzelwertung der Symptome die symptomatischen Frühkombinationen mit den bisher bekannten (sogenannte "klassische Trias", "YOUTE"-Trias und "extrarenale" Trias) diskutiert.

- Die Symptomtrias - BSR-Beschleunigung, Haematurie und Hyperfibrinogenaemie - stellt dabei die in der größten Häufigkeit auftretende dar.

- Von den anamnestischen Angaben treten häufig auf:

  Gewichtsverlust
  Schmerz
  Übelkeit/Erbrechen
  Impotenz

- Hervorstechende klinische Symptome sind:

  Hypertonie
  poly. Ikterus
  Metastasen
  Tumor-Kachexie

- Die laborchemischen Werte ergeben folgende Häufigkeit:

  [illegible]
  Hyperämie
  Erhöhung des Serum-Fibrins
  Anämie

- [illegible]

- Bei der Aufschlüsselung unseres Patientengutes hinsichtlich der Einweisungsdiagnosen war in keinem Fall der Verdacht auf das Vorliegen eines hypernephroiden Nierencarcinoms geäußert. Nur einmal wurde die Einweisungsdiagnose "Verdacht auf einen Nierentumor" gestellt. Deshalb erscheint es besonders dringlich, die Früherkennung des hypernephroiden Nierencarcinoms zu ermöglichen.

- Aus der Zusammenstellung der Häufigkeiten von Einzelsymptomen und deren Kombinationen läßt sich ein diagnostischer Weg zur Früherkennung dieses Carcinoms ableiten:

1. Anamnese — Hypertonie
Nierenerkrankung
Operation

2. Klinik — Hypertonie
Fieber
palpabler Tumor

3. Blutbefunde — BSG-Beschleunigung
Anämie
Erhöhung des Serum-Eisens

4. Urinbefunde — Hämaturie im Sediment

5. Röntgenuntersuchung — i.v.-Pyelogramm
Nierenangiographie